



Tendencia de las aves nocturnas

Dirección: Juan Carlos del Moral.

Análisis de datos y edición: Virginia Escandell y Emilio Escudero.

Cita recomendada: SEO/BirdLife 2013. Resultados del programa Noctua 2006-2013. SEO/BirdLife. Madrid.

Los resultados que aquí se incluyen proceden del análisis realizado por SEO/BirdLife de los datos del programa Noctua (tendencia de las aves nocturnas) disponibles hasta diciembre de 2013.

Esta información existe gracias a la labor desinteresada realizada desde 1998 por más de 1.000 personas (coordinadores regionales y participantes), a quien se dirige el principal agradecimiento. Más información sobre estos programas de seguimiento de SEO/BirdLife se puede encontrar en <http://www.seo.org/trabajamos-en/estudio-de-especies/>.

Todos los participantes se incluyen en: <http://www.seo.org/?p=7971>







BÚHO REAL (*Bubo bubo*)

España

Muestra	Tendencia 2006-2013	Evol. media interanual (2006-2013)	Cambio (%) respecto a 2006
220	Incremento fuerte (p<0.05) *	9,6 (5,9; 13,3)	91,09



Región eurosiberiana

DATOS INSUFICIENTES

Región alta montaña


DATOS INSUFICIENTES

DATOS INSUFICIENTES

DATOS INSUFICIENTES

Región mediterránea norte

Muestra	Tendencia 2006-2013	Evol. media interanual	Cambio (%)
49	Incremento moderado (p<0.05) *	9,4 (1; 17,9)	110,62



Región mediterránea sur

Muestra	Tendencia 2006-2013	Evol. media interanua	Cambio (%)
148	Incremento fuerte (p<0.05) *	10 (5,5; 14,4)	90,17

