



Tendencia de las aves en primavera

Dirección: Juan Carlos del Moral.

Análisis de datos y edición: Virginia Escandell y Emilio Escudero.

Cita recomendada: SEO/BirdLife 2013. Resultados del programa Sacre 1996-2013. SEO/BirdLife. Madrid.

Los resultados que aquí se incluyen proceden del análisis realizado por SEO/BirdLife de los datos del programa Sacre (tendencia de las aves en primavera) disponibles hasta diciembre de 2013.

Esta información existe gracias a la labor desinteresada realizada desde 1996 por más de 2.000 personas (coordinadores regionales y participantes), a quien se dirige el principal agradecimiento. Más información sobre estos programas de seguimiento de SEO/BirdLife se puede encontrar en:

<http://www.seo.org/trabajamos-en/estudio-de-especies/>.

Todos los participantes se incluyen en: <http://www.seo.org/?p=7971>




SEO/BirdLife

BISBITA ARBÓREO (*Anthus trivialis*)

España


Muestra	Tendencia 1998-2013	Evol. media interanual (1998-2013)	Cambio (%) respecto a 1998
263	Estable	0,6 (-0,8; 2)	-7,09



CUADRÍCULAS CONSIDERADAS




REGIONES




Región eurosiberiana

Muestra	Tendencia 1998-2013	Evol. media interanual	Cambio (%)
109	Estable	-0,5 (-3,5; 2,5)	-27,39




Región alta montaña

Muestra	Tendencia 1998-2013	Evol. media interanual	Cambio (%)
43	Estable	0,8 (-2,5; 4)	33,6



Región mediterránea norte

Muestra	Tendencia 1998-2013	Evol. media interanual	Cambio (%)
96	Estable	1,1 (-0,8; 2,9)	-3,53



Región mediterránea sur

DATOS INSUFICIENTES

DATOS INSUFICIENTES