



Tendencia de las aves en primavera

Dirección: Juan Carlos del Moral.

Análisis de datos y edición: Virginia Escandell y Emilio Escudero.

Cita recomendada: SEO/BirdLife 2013. Resultados del programa Sacre 1996-2013. SEO/BirdLife. Madrid.

Los resultados que aquí se incluyen proceden del análisis realizado por SEO/BirdLife de los datos del programa Sacre (tendencia de las aves en primavera) disponibles hasta diciembre de 2013.

Esta información existe gracias a la labor desinteresada realizada desde 1996 por más de 2.000 personas (coordinadores regionales y participantes), a quien se dirige el principal agradecimiento. Más información sobre estos programas de seguimiento de SEO/BirdLife se puede encontrar en:

<http://www.seo.org/trabajamos-en/estudio-de-especies/>.

Todos los participantes se incluyen en: <http://www.seo.org/?p=7971>





SEO/BirdLife

PERDIZ ROJA (*Alectoris rufa*)


España

Muestra	Tendencia 1998-2013	Evol. media interanual (1998-2013)	Cambio (%) respecto a 1998
945	Declive moderado ($p < 0.01$) **	-1,5 (-2; -1)	-32,92




Región eurosiberiana

Muestra	Tendencia 1998-2013	Evol. media interanual	Cambio (%)
47	Incierto	7,6 (-0,8; 16,1)	168,46




Región alta montaña

Muestra	Tendencia 1998-2013	Evol. media interanual	Cambio (%)
91	Estable	1,3 (-1,5; 4,1)	28,75



Región mediterránea norte

Muestra	Tendencia 1998-2013	Evol. media interanual	Cambio (%)
291	Estable	0,2 (-0,8; 1,3)	-27,44



Región mediterránea sur

Muestra	Tendencia 1998-2013	Evol. media interanual	Cambio (%)
514	Declive moderado ($p < 0.01$) **	-2,2 (-2,8; -1,5)	-35,67

