

# Pardela cenicienta

(*Calonectris diomedea*)


45-56 cm

|       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |
|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|



Ave marina, fuerte y parda, muy limpia por debajo. Con importante pico amarillento, con punta oscura. Área oscura en la cabeza, con efecto de capucha. Dorso pálido y jaspeado. Voces lúgubres: kaa-guá, kaa-guá. Colonias en islas deshabitadas, islotes, roques.... Pesca en aguas costeras. Vuelo con las alas tiesas y batidos veloces, con aletazos en ausencia de viento. La única pardela que vuela a vela y remonta hasta grandes altitudes. Forman grupos llamados “balsas” al atardecer, frente a lugares de cría que visita sin luz. Dos subespecies una cría en el archipiélago balear y otras islas mediterráneas y la Ssp. borealis, es muy común en Canarias. Aunque está en disminución, aunque en mejor situación que la mediterránea. Estival, ocasional en invierno.

## DISTRIBUCIÓN



Vuelo con las alas tiesas y batidos veloces